

### 令和4年度 えりも「春薬柳」実証栽培記録④ 【えりも町営、元育成牧場地内】

■植林面積（全体面積＝352 m<sup>2</sup> 106 坪） W:16M×D:30.0M 【標高：295M】

●各部位 / 育林実施 ■全体森林面積①→0.035ha

春薬柳 調査日	日付	令和4年9月2日	天気	晴れ	気温	20.1℃
定植日	日付	令和2年7月1日	樹齢	2.2年木		

春薬柳 敷地サイズ：W=16,000mm×D=30,000mm（台形）（畝＝6列×13本～19本＝100本）

■春薬柳 <成長記録> ※カラー→生育状況を表す

	不良		標準		良好		鹿の捕食		枯れ
--	----	--	----	--	----	--	------	--	----

●えりも山林 管理地→定植時「春薬柳」（根付タイプ）100本

●現場定植時 h→≒5cm

①～⑥ 春薬柳 / 凡例：赤色→枯れ・無

生育率（36%）

R2/7 R2/10 R3/6 R4/9

①	0 cm	45 cm	0 cm	20 cm	5 cm	110 cm	0 cm				13	9	4	4
②	0 cm	80 cm	90 cm	0 cm	105 cm	70 cm	15 cm				13	10	6	5
③	0 cm	25 cm	25 cm	40 cm	90 cm	90 cm	15 cm	0 cm			18	11	8	6
④	0 cm	0 cm	120 cm	0 cm	35 cm	70 cm	164 cm	110 cm			18	10	5	5
⑤	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	130 cm	100 cm	130 cm	115 cm	0 cm	0 cm	19	16	6	4
⑥	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm	160 cm	0 cm	0 cm	0 cm	19	15	6	1
総数											100	61	36	25

A B C D E F G H I J

上側→東面

下側→西面

●圃場は町有地育成牧場内の試験地。鹿進入防止柵設置済み。クマイササ繁殖地の土壌場所。

●柳根竹＝育成26ヶ月の生育状況は、クマササ下刈り未了により育成不良。

●育成一穂場管理が不良から多数立ち枯れ発生。全体 1/4 の育成状況。

□育成柳→標準（平均約78cm以上）

□育林俯瞰（鹿進入柵により食害）



一面笹藪になっている＝1m  
定期的な下刈りが重要である

立ち枯れしたが  
新芽が出はじめた

